



Informovaný souhlas pacienta (tky) s výkonem

OPERACE LUPAVÉHO PRSTU, M. DE QUERVAINÉ

Jméno pacienta:	<input type="text"/>
Datum narození:	<input type="text"/>
Přijímající lékař:	<input type="text"/>

Vážená paní, vážený pane,

rozhodl (a) jste se podrobit chirurgickému zákroku. Před touto operací budete ošetřujícím lékařem podrobně informován (a) o povaze a způsobu provedení operace a o možných pooperačních komplikacích a následcích. Tento materiál by Vám měl podat základní informaci o plánované operaci.

CÍL A POPIS VÝKONU

Šlachy ohýbačů vedou z předloktí- probíhají uvnitř kanálků zvaných šlachové pochvy. Ty mají komplexní systém zesílení- tzv. poutka. Na prstech jich je 5 (A1-A5), na palci 3 (A1, šikmé, A2). Celý systém je velmi podobný brzdě na kole.

Šlachy jsou kryty povrchovou vrstvou zvanou tenosynovium- to umožňuje volný klouzavý pohyb skrz poutka. Věkem či z jiných příčin tenosynovium degeneruje a ztlušťuje se- stav zvaný tenosynovitis- může být pocíťováno jako slabost, ztuhlost či otok prstů.

Skákavý (lupavý) prst je způsoben ztluštěním šlachy a okolí, čímž dochází k zasekávání šlachy v její pochvě. Často je možné cítit toto ztluštění ve dlani při pohybu prstem. Stav se může vyskytovat u kteréhokoli prstu či u více najednou.

M. de Quervaine-je zánět v místě bodcovitého výběžku vřetenní kosti způsoben ztluštěním šlachy a okolí krátkého natahovače palce a dlouhého odtahovače palce.

Jsou 2 možnosti řešení:

1. Obstřík: malé množství kortikoidu je aplikováno do okolí šlachy- to omezí otok šlachy a umožní znovu hladké klouzání šlachy v její pochvě. Jediný obstřík může účinkovat až v 50 % případů, v dalších 25 % může zabrat 2. obstřík /tedy až ¾ pacientů mohou být vyléčeny tímto způsobem/. Obstřík neúčinkuje ihned. Nezpůsobuje celkové vedlejší účinky, někdy jen ztluštění kůže v okolí vpichu. Proto také 2 obstříky jsou maximum této možnosti. Bohužel i při úspěchu této metody se přesakování může vrátit.
2. Operace: pokud neúčinkuje obstřík. Zahrnuje zákrok v místním znecitlivění. Je vytvořen otvor ve šlachové pochvě- jako prevence zachytávání šlachy v místě zesílení. Tato operace je obvykle prováděna v místním umrtvení. Ruka je poté bandážována obvazem, který umožňuje pohyb prstů a ruky. Stehy se odstraňují 2 týdny po operaci.

MOŽNÉ KOMPLIKACE

Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže garantovat nekomplikovaný průběh operace a pooperační rekonvalescence. Komplikace během operace a po ní se v určitém, i když velmi malém, procentu vyskytují a je tedy nutné, abyste si těchto možných komplikací byl(a) vědom(a). Lze říci, že



pravděpodobnost výskytu komplikace je přímo úměrná přítomnosti rizikových faktorů. Těmi mohou být pokročilý věk, přítomnost dalších onemocnění (diabetes mellitus, ateroskleróza, onemocnění srdce a plic atd.), nesprávná životospráva (obezita, kouření) a větší rozsah operačního výkonu. Vyšší riziko komplikací mají samozřejmě pacienti nedodržující pokyny lékaře.

Všeobecné komplikace

Mezi všeobecné komplikace, hrozící obecně při jakékoliv operaci, patří krvácení během operace a po ní, infekce, roztržení operační rány, prodloužené hojení rány, tvorba hypertrofických až keloidních jizev, alergická reakce na desinfekci, použitá léčiva nebo na šicí a obvazový materiál. Při vážných komplikacích může být nutná opakovaná operace.

Specifické komplikace

Mezi specifické komplikace zařazujeme vzácné poškození nervů (s násl. tupostí části prstu), bolestivost jizvy dlaně nebo vznik algodystrofického syndromu (Sudeckův syndrom), což je onemocnění, provázené výrazným otokem a bolestmi celé ruky. Tato komplikace pak vyžaduje i několikaměsíční intenzivní léčbu a neléčena může způsobit trvalé postižení ruky. Vyloučit nelze ani recidivu obtíží při nadměrném jizvení a tvorbě srůstů v místě zákroku.

Komplikace při a po operaci se mohou objevit i přes naši maximální možnou snahu jim zabránit. Většina komplikací je však řešitelných. Tato informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře nebo operátora na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu ještě zajímá. I sebelépe provedeným výkonem nelze splnit nerealistická očekávání. **Prosím, ptejte se na všechno, co se Vám zdá důležité!**

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu a dále způsob jeho provedení a možné alternativy. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím, aby byly tyto výkony provedeny.

Seznámil(a) jsem se s poučením o zdravotním výkonu.

Datum:

Podpis pacienta
(zákonného zástupce)