

POUČENÍ PŘED PODÁNÍM OČKOVACÍ LÁTKY COMIRNATY

Vážená paní / Vážený pane,

projevil(a) jste zájem o očkování proti nemoci COVID-19. Bude Vám podána očkovací látka COMIRNATY (dále jen „očkovací látka“), která je určena pro osoby od 16 let věku. Cílem očkování je zabránit vzniku onemocnění COVID-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2. Stejně jako v případě jiných očkovacích látek, ani tato očkovací látka nemusí plně ochránit očkováného proti nemoci. Máte-li pochybnosti o vhodnosti očkování, konzultujte svůj záměr o očkování se svým praktickým lékařem. Níže uvedený dotazník nám pomůže určit, zda by se dnešní očkování mělo provést nebo odložit. Pokud na některou z níže uvedených otázek odpovíte „ano“, neznamená to, že nemůžete být očkován(a).

Cítíte se dnes nemocný(á) nebo máte zhoršený průběh svého základního onemocnění ?	ANO	NE
Prodělal(a) jste nemoc COVID-19 ?	ANO	NE
Měl(a) jste problémy po podání první dávky očkovací látky proti COVID-19?	ANO	NE
Měl(a) jste někdy vážnou alergickou reakci na jiné očkování, léčivý přípravek nebo potraviny?	ANO	NE
Máte nějakou krvácivou poruchu nebo berete léky ovlivňující srážlivost krve ?	ANO	NE
Máte nějakou závažnou poruchu imunity nebo užíváte léky, kterého ovlivňují ?	ANO	NE
Jste těhotná nebo kojíte? Těhotným nebo kojícím ženám se v současné době očkování nedoporučuje.	ANO	NE

Očkovací látka Vám bude podána injekčně do ramenního svalu. Po očkování Vám bude vydána Kartačka očkováného. Je velmi důležité, abyste podstoupil(a) i druhou dávku očkování, jinak Vás nemusí očkování dostatečně ochránit proti onemocnění COVID-19. Druhá dávka Vám bude podána nejdříve za 21 dní po podání první dávky. Ochrana proti onemocnění COVID-19 nemusí být dostatečná dříve než sedmý den po podání druhé dávky očkovací látky. Do té doby je nutné se chovat podle doporučených hygienicko-epidemiologických postupů k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních. Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky. Pokud se vyskytnou, jsou zpravidla lehké a odezní během několika málo dní.

U více než jednoho očkováného z deseti se může vyskytnout bolest nebo zduření v místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, svalů nebo kloubů, zimnice nebo horečka.

U méně, než jednoho očkovaného z deseti se může vyskytnout otok nebo zarudnutí v místě vpichu injekce nebo pocit na zvracení.

U méně, než jednoho očkovaného ze sta se může vyskytnout zvětšení lymfatických uzlin nebo malátnost. Někteří lidé mohou vzácně mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se nejčastěji projevuje jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte svého praktického lékaře nebo v sobotu, neděli a ve svátek pohotovostní lékařskou službu, v případě ohrožení života a zdraví kontaktujte, jste-li v nemocnici, resuscitační tým nemocnice na telefonním čísle 2222, mimo nemocnici zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155). Bez včasné pomoci lékaře může dojít k újmě na zdraví, ve výjimečném případě můžete být také ohrožen(a) na životě.

V případě, že se u Vás některý z jiných neočekávaných nebo vážných nežádoucích účinků vyskytne, informujte prosím epidemiologa MUDr. Milana Bořka, 602 113 080), který informaci o nežádoucím účinku předá SÚKL.

Po podání očkovací látky je nezbytné po dobu 15 minut setrvat na místě, kde se provádí očkování. Dva dny po očkování se vyvarujte výraznější fyzické námahy.

Pročetl(a) jsem a porozuměl(a) jsem textu a měl(a) jsem možnost klást dotazy. Prohlašuji, že nevím o žádném důvodu, který by mi bránil v aplikaci této očkovací látky. Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s možnými vedlejšími účinky. Těmto informacím rozumím a nemám žádné otázky ani nejasnosti. Byl(a) jsem poučen(a) o způsobu aplikace vakcíny a postvakcinačním režimu.

Žádám o provedení očkování.

Jméno: Příjmení: Rodné číslo:

Adresa bydliště: Zdravotní pojišťovna:

V Rychnově nad Kněžnou, dne Podpis očkovaného

Vyplňuje zdravotník

Teplota:

Paže dominantní ANO - NE

Aplikoval:

Podpis:

Datum a čas aplikace: