



Informovaný souhlas s push-enteroskopií a jednobalónovou enteroskopií orálním přístupem

Vážená(ý) paní(e),

ve Vašem vyšetřovacím a léčebném postupu Vám lékař doporučil push-enteroskopii či jednobalónovou enteroskopii.

Push-enteroskopie je vyšetření pouze části tenkého střeva endoskopem, tenkou ohebnou trubicí, která umožňuje zobrazení sliznice trávicí trubice, odběr vzorků k vyšetření, popřípadě léčebný zákrok. Vyšetření se provádí nalačno. Přístroj je v poloze na levém boku zaváděn ústy (tedy odborně „orálním přístupem“) do jícnu a dále přes žaludek do dvanácterníku a dále do tenkého střeva při místním znecitlivění hltnu anestetikem v aerosolu. V úvodu a dále v průběhu výkonu jsou podle potřeby postupně podávány do žíly léky na krátkodobé celkové utlumení a snížení bolesti (analgesedace). Push-enteroskopie je endoskopické vyšetření části jejunu (tenkého střeva), jednobalónová enteroskopie umožňuje vyšetření větší části nebo i celého tenkého střeva pomocí střídavého nafukování a vyfukování balónku, který je na konci převlečné trubice. Pohybem endoskopu a převlečné trubice vůči sobě se velká část trávicí trubice tenkého střeva zobrazí na videosytému, který lékaři umožní zobrazit co největší oblast tenkého střeva.

Push-enteroskopie a jednobalónová enteroskopie je diagnostická metoda vyšetření tenkého střeva. Podle povahy onemocnění může navazovat bezprostřední nebo odložený plánovaný léčebný zákrok.

Push-enteroskopie se provádí ambulantně a pacient by měl mít domluvený doprovod. Pokud jsou před nebo v průběhu vyšetření nitrožilně podány léky (analgesedace), měl by pacient v následujících 24 hodinách dodržovat relativní fyzický klid, dále nesmí 12 hodin po podání analgesedace řídit motorová vozidla, vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a nesmí pít alkoholické nápoje.

Jednobalónová enteroskopie se provádí při krátkodobé hospitalizaci, po výkonu se pacient vrací zpět na lůžkovou část, kde dodržuje fyzický klid a je pravidelně kontrolován zdravotnickým personálem včetně biochemických rozborů krve a jsou mu podávány infúzní roztoky.

Alternativním vyšetřením push-enteroskopie a balónové enteroskopie je kapslová endoskopie tenkého střeva, kde je možné neinvazivním způsobem stanovit diagnózu, nikoliv provést léčebný zákrok. Další alternativou je rentgenové vyšetření tenkého střeva (CT- nebo MR-enteroklýza). Tato vyšetření neumožní odběr biologického materiálu k dalšímu vyšetření ani případný léčebný zákrok. Poslední možností je provedení intraoperační enteroskopie (endoskopické vyšetření střeva přímo v průběhu chirurgické operace).

Push-enteroskopie a jednobalónová enteroskopie jsou vzácně spojeny s rizikem komplikací (časné nebo pozdní krvácení, porušení stěny trávicího ústrojí). Jednobalónová enteroskopie může být komplikována akutním zánětem slinivky břišní. Riziko krvácivé komplikace zvyšují některé léky určené ke snížení srážlivosti krve (warfarin, heparin, anopyrin, plavix, trombex, aspirin atd..). Tyto léky zvyšující riziko krvácení je nutné před vyšetřením přechodně vysadit.



**Nemocnice
Náchod**

Endoskopické centrum
Gastroenterologie a hepatologie
Purkyňova 446, Náchod, tel.: 491 601 577



Vyšetření bude provedeno podle uznávaných moderních lékařských postupů a za dodržení všech zásad správné klinické praxe. I při dodržování výše uvedených opatření může dojít ke komplikacím výkonu, které mohou způsobit prodloužení pobytu či potřebu chirurgického zákroku.

V případě podezření na komplikaci se můžete obrátit v pracovní době na lékaře Endoskopického centra ON Náchod na tel. 491601577, příp. svého praktického lékaře, mimo pracovní dobu na Záchranou zdravotní službu – tel. 155 (ev. chirurgickou ambulanci na tel. 491 601 117).

Prohlašuji, že jsem poučení porozuměl(a) a souhlasím s uvedeným lékařským výkonem a jakýmkoli dalším výkonem, pokud by jeho neprovedení bezprostředně ohrozilo moje zdraví či život.

Jméno a příjmení pacienta:

Číslo vyšetření:

Rok narození pacienta:

Razítko oddělení:

Podpis pacienta:

Podpis lékaře:

V Náchodě:

Datum: