



Informovaný souhlas s kapslovou endoskopií tenkého/ tlustého střeva

Vážený pane, vážená paní,

ve Vašem vyšetřovacím a léčebném postupu Vám lékař doporučil vyšetření pomocí endoskopické kapsle určené k vyšetření tenkého/tlustého střeva. Důvodem vyšetření je podezření na onemocnění tenkého/tlustého střeva.

Vyšetření se provádí nalačno 6 hodin před výkonem je třeba nejíst, k utišení žízně pít jen čiré tekutiny, nekouřit. Pokud je vyšetření prováděno dopoledne, je vhodné odložit užití ranních léků až po jeho provedení. Při vyšetření tlustého střeva je nutná příprava dle doporučeného návodu.

Vyšetření se provádí spolknutím speciální diagnostické kapsle, která obsahuje mikrokameru, zdroj světla a vysílač. Kapsle při průchodu trávicím ústrojím snímá barevné obrázky vnitřku střeva, vysílá je a obrázky zaznamenává do nahrávacího zařízení, které pacient nosí po dobu vyšetření při sobě. Kapsle k vyšetření tenkého střeva je z pacienta vyloučena po několika dnech (nejdéle do dvou týdnů) přirozenou cestou se stolicí. Při vyšetření tlustého střeva je vyloučena v ideálním případě v odpoledních hodinách ve stejném dni, kdy byla polknuta. Kapslová endoskopie neumožňuje odebrat vzorky tkáně k dalším vyšetřením ani provádět žádný léčebný zákrok.

Výhodou kapslové endoskopie je malá zátěž pro pacienta a přímé zobrazení sliznice tenkého/tlustého střeva. Vyšetřované střevo je zobrazeno v celém rozsahu zhruba v 75% případů (to je dáno rychlostí postupu endoskopické kapsle trávicím ústrojím a životností baterií, které zajišťují osvětlování, snímání a vysílání obrázků).

Vzácně je kapslová endoskopie spojena s rizikem uvíznutí kapsle nad postiženým místem střeva nebo v jeho výchlipce. Pokud k uvíznutí kapsle dojde, je následně vyjmuta endoskopicky nebo chirurgicky.

Z bezpečnostních důvodů se kapslová endoskopie neprovádí v těhotenství. Před vyšetřením je třeba upozornit na zavedený kardiostimulátor nebo kardiovertor. Rovněž z bezpečnostních důvodů není možno ve stejné době, kdy probíhá kapslová endoskopie, provést vyšetření magnetickou nukleární resonancí.

Kapslová endoskopie se provádí ambulantně, po dobu vyšetření (8 – 10 hodin) se pacient zdržuje ve zdravotnickém zařízení.

Alternativou kapslové endoskopie jsou endoskopická vyšetření (enteroskopie, kolonoskopie) nebo rentgenologická vyšetření (enteroklýza, irigografie, CT enterografie, CT kolografie, MRI)

V případě podezření na uvíznutí endoskopické kapsle nebo při jinak nevysvětlitelných bolestech břicha v časové souvislosti s kapslovou endoskopií kontaktujte lékaře Endoskopického centra na t.č. 491 601 577 (580), mimo pracovní dobu volejte Záchranou službu na 155 (event. chirurgickou ambulanci na tel. 491 601 117)



**Nemocnice
Náchod**

Endoskopické centrum
Gastroenterologie a hepatologie
Purkyňova 446, Náchod, tel.: 491 601 577



Prohlašuji, že jsem textu poučení porozuměl(a) a souhlasím s uvedeným lékařským výkonem (léčebným postupem) a jakýmkoli dalším výkonem, pokud by jeho neprovedení bezprostředně ohrozilo moje zdraví či život.

Prohlašuji, že jsem poučení porozuměl(a) a souhlasím s uvedeným lékařským výkonem a jakýmkoli dalším výkonem, pokud by jeho neprovedení bezprostředně ohrozilo moje zdraví či život.

Jméno a příjmení pacienta:

Číslo vyšetření:

Rok narození pacienta:

Razítko oddělení:

Podpis pacienta:

Podpis lékaře:

V Náchodě:

Datum: