

INFORMOVANÝ SOUHLAS

CIRKUMCIZE

Vážený pane,

Vášim ošetřujícím lékařem byla zjištěna zúžená předkožka, která se nedá přetáhnout přes žalud penisu. Důsledkem tohoto onemocnění mohou být opakované infekty předkožky a přilehlé části žaludu, poruchy močení s opakovanými záněty močových cest. Toto onemocnění může vést k poruchám erekce, a v neposlední řadě může dojít ke vzniku nádoru penisu.

Před výkonem:

- Den před operací od půlnoci nejíst, nepít nekouřit
- Ráno v den operace zajistíme bandáže dolních končetin, jako prevenci žilní trombózy

Popis operace:

Operace se provádí v celkové nebo lokální anestezii a její rozsah se řídí podle stupně postižení. Může být odstraněna pouze zjizvená část předkožky na periferní části nebo odstranění předkožky může být úplné. Při některých menších problémech s přetažením předkožky postačí provést pouze plastickou úpravu uzdičky. Šití operační rány je prováděno vstřebatelným materiálem, který se spontánně v průběhu 10 až 20 dnů odloučí.

Po výkonu:

- Po operaci budete umístěn na pooperační pokoj
- V případě bolesti Vám budou podávány léky tlumící bolest
- Infuze budete dostávat dle Vašeho aktuálního stavu
- Při propuštění Vás budeme informovat o další léčbě, režimových opatřeních a kontrolách

Komplikace při a po výkonu:

- **Krvácení z drobné cévy**
- Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Přestože veškerá vyšetření prokázala, že operace je pro vás bezpečná, může nastat některá z obecných komplikací, které nemají souvislost s typem vaší operace, jako například:
 - **Alergická reakce** – Tato reakce se může objevit při přípravě k operaci během operace i v pooperačním průběhu. Jedná se o přecitlivělost na podaný lék nebo desinfekční prostředek. Může se projevit jako kopřivka, zarudnutí, svědění kůže, ale může mít i podobu závažnější jako jsou dechové obtíže, celková slabost, pokles krevního tlaku s rozvojem šokového stavu. Projevuje se nejčastěji do několika vteřin nebo minut po podání léku nebo desinfekčním prostředku (při desinfekci operačního pole). Tato reakce se může vyskytnout také kdykoli i u pacientů, kteří dosud nejsou na nic alergičtí. Pokud budete podobnou reakci pozorovat ihned informujte zdravotní personál.
 - **Trombóza hlubokých žil dolních končetin** – Tato komplikace se může objevit během operace a v pooperačním období. Jedná se o vytvoření krevní sraženiny v žilním systému dolních končetin. Největším rizikem je odtržení této sraženiny, kdy je krevním řečištěm odplavena do plicních cév, které může ucpat. Závažnost této komplikace závisí na velikosti této sraženiny a místu, kde k ucpání došlo. V konečném důsledku pak může způsobit dechové

obtíže, šokový stav nebo při velkém objemu i smrt. Riziko trombózy se zvyšuje s nehybností po operaci, nehybností končetin, dehydratací, dále u pacientů, kteří trpí onemocněním žil dolních končetin nebo u takových, kteří již podobnou komplikaci prodělali. Jako prevenci vzniku této komplikace podáváme látky na ředění krve po dobu imobilizace.

Alternativy výkonu:

Operační řešení nemá alternativu. Rekonvalescence trvá několik týdnů

Souhlas pacienta

Pan/paní MUDr. mě v rozhovoru podrobně informoval/a o plánovaném zákroku a léčebném výkonu. Též jsem byl/a informován/a o možných variantách zákroku, jeho následcích a komplikacích. Vše mi bylo sděleno srozumitelně, bylo mi umožněno si vše řádně zvážit a měl/a jsem též možnost se zeptat na vše, co považuji za podstatné a bylo mi umožněno klást doplňující otázky. Byl/a jsem upozorněna na eventuální nutnost zákrok rozšířit nebo modifikovat v závislosti na místním nálezu a celkovém stavu organismu. Považuji poučení za dostatečné, nemám další otázky a souhlasím s navrhovaným výkonem. V případě nutnosti souhlasím i s nutným rozšířením nebo modifikací výkonu, v případě potřeby i s podáním transfuze krve.

Datum Podpis pacienta

Podpis zákonného zástupce.....

Podpis lékaře