



INFORMOVANÝ SOUHLAS S ENDOSKOPICKÝM VYŠETŘENÍM – ERCP

/Endoskopická Retrográdní CholangioPankreatikografie/

Jméno, příjmení:.....

R.č.:.....

Z důvodů diagnostických i léčebných se u Vás pokládá za vhodné provedení endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP).

Vyšetřením se dá rozpoznat onemocnění žlučového systému, slinivky břišní a oblast jejich společného vyústění. Současně lze provádět i léčebné zákroky jako je odstranění kamenů ze žlučodů, nebo ošetření zúžení (stenoz) žlučového systému.

Jedná se o kombinované endoskopické a rentgenové vyšetření.

Ohebný přístroj (endoskop) se zavede po místním znecitlivění ústy přes jícen a žaludek až do dvanáctníku k místu vyústění žlučovodu a slinivky břišní. Tenkou cévkou, nebo jemným vodičem se sonduje podle potřeby žlučod, nebo vývod slinivky břišní. Vyšetření trvá zpravidla 15 – 30 minut.

Před vyšetřením alespoň 8 hodin nejezte, ale pijte čiré tekutiny (voda, čaj).

Informujte lékaře o alergických reakcích a o závažných onemocněních, pro která jste léčen/a. Odstraňte si zubní náhrady.

Těsně před vyšetřením Vám bude aplikován do úst spray k místnímu znecitlivění a nitrožilní injekce, která způsobí snížené vnímání bolesti, zklidnění a lehký útlum.

Po této přípravě se uložíte na levý bok na vyšetřovací stůl a sestra Vám vloží mezi čelisti ochranný kroužek. Lékař Vám potom zavede endoskop ústy přes žaludek do dvanáctníku. Snadnému zavedení můžete po výzvě pomoci zadržením dechu a pokusem o polknutí (podobně jako polknutí prášku nasucho). Po zavedení se „soustředíte zcela na klidné, pomalé dýchání, sliny nechte volně odtékat do buničiny, nepolykejte je.

Po dosažení dvanáctníku Vám někdy pomůžeme k přetočení na břicho.

Občas je potřeba rozšířit ústí žlučovodu, odstraňovat kameny, nebo řešit zúžení žlučovodu.

V takovém případě se délka vyšetření může prodloužit.

Vyšetření je minimálně bolestivé, bývá však nepříjemné. Pocit dávení překonáte pomalým hlubokým dýcháním. Dýchací cesty zůstanou naprosto volné, můžete dýchat nosem i ústy.

Délku výkonu podstatně zkrátí dobře spolupracující nemocný.

ERCP není zcela bez rizika. Může dojít k zánětu slinivky břišní, ke krvácení nebo proděravění dvanáctníku v místě případného léčebného zákroku, nebo k zavlečení infekce. Některé komplikace si mohou vynutit prodloužení hospitalizace, nebo chirurgický zákrok. Výskyt závažných komplikací je vzácný (pohybuje se kolem 1 – 3%).

Přínos ERCP pro léčbu však vysoce převažuje míru rizika.



Nemocnice
Náchod

Oblastní nemocnice Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Gastroenterologická ambulance - Interní oddělení
Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou, tel. č. 494 502 111

Pokud máte v souvislosti s endoskopickým vyšetřením jakékoli dotazy, neváhejte se s nimi obrátit na lékaře.

Prohlašuji, že jsem poučení porozuměl/a/ a souhlasím s uvedeným lékařským výkonem (léčebným postupem) a jakýmkoliv dalším výkonem, pokud by jeho neprovedení bezprostředně ohrozilo moje zdraví či život.

.....
Podpis pacienta/ky

.....
Jméno, příjmení a podpis
zákonného zástupce
V případě, že není stanoven, proškrtnout

V Rychnově nad Kněžnou dne

Vysvětlující pohovor provedl
Razítko a podpis lékaře