



INFORMOVANÝ SOUHLAS S ENDOSKOPICKÝM VYŠETŘENÍM KOLONOSKOPIE

Jméno, příjmení:

R.č.:

Na základě Vašich potíží nebo jako preventivní opatření k časnému rozpoznání možné choroby se u Vás pokládá za žádoucí endoskopie TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU.

Vyšetření se provádí pomocí tenké ohebné sondy a trvá průměrně cca 30 minut.

Před vyšetřením je třeba střevo očistit speciálním roztokem, který obdržíte společně s návodem na přípravu. Ke každému vyšetření je třeba přinést čerstvé výsledky krevního obrazu, destiček a Quickova testu.

Informujte sestru či lékaře o **alergických reakcích na léky a o závažných onemocněních**, pro která jste léčeni.

Dle pokynů sestry se po odložení oděvu uložíte na vyšetřovací lůžko na levý bok s pokrčenými koleny. Těsně před výkonem Vám bude podána nitrožilní injekce s analgetikem, která může způsobovat následnou ospalost, vyšetření je však možno šetrně provést i bez injekce nebo v inhalační sedaci.

Po této přípravě Vám lékař zavede konečníkem přístroj do střeva. V průběhu vyšetření je třeba někdy měnit polohu těla podle instrukcí sestry, která Vám při otáčení pomůže.

Při průchodu střevními ohyby můžete mít pocit nepříjemného tlaku, který se po překonání překážky zmírní. Střevo se při vyšetření rozfukuje vzduchem, což může rovněž vyvolat pocit tlaku. V případě větší bolesti je možno opakovat injekci sedativa nebo i analgetika.

Někdy je potřeba během vyšetření odebrat vzorky sliznice, odstranit výrůstky (polypy), nebo stavět případné přítomné krvácení. Tyto procedury jsou zcela nebolestivé, vyšetření však trvá o něco déle.

Potíže během vyšetření se zmírní klidným a pomalým dýcháním, co největším uvolněním břicha a vypouštěním přebytečného vzduchu uvolněným konečníkem. Napínání a zbytečný strach mohou být samy o sobě příčinou bolesti.

Po nekomplikovaném vyšetření je možno po odeznění sedativního účinku injekce opustit nemocnici. Pokud dostanete injekci sedativa, nesmíte celý den řídit motorové vozidlo.

Komplikace jsou u diagnostické kolonoskopie vzácné. V ojedinělých případech může být vyvoláno krvácení, porušení stěny orgánů, nebo dojít k alergické reakci na léky podané před vyšetřením. Většinu komplikací je lékař schopen ošetřit již v průběhu výkonu.

Alternativou kolonoskopického vyšetření je CT koloskopie. Její vypovídající schopnost je mírně nižší, nelze při tomto vyšetření odebrat bioptické vzorky, ani případně provést léčebný zákrok a navíc jde o nezanedbatelnou radiační zátěž.

Prohlašuji, že jsem poučení porozuměl/a/ a souhlasím s uvedeným lékařským výkonem (léčebným postupem) a jakýmkoliv dalším výkonem, pokud by jeho neprovedení bezprostředně ohrozilo moje zdraví či život.

.....
Podpis pacienta/ky

.....
Jméno, příjmení a podpis
zákonného zástupce

V případě, že není stanoven, proškrtnout

V Rychnově nad Kněžnou dne

Vysvětlující pohovor provedl

Razítko a podpis lékaře