

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM LAPAROSKOPICKÝ DIAGNOSTICKÝ NEBO OPERAČNÍ VÝKON

Vážená paní,  
na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena laparoskopická operace. Chtěli bychom Vás blíže informovat o plánovaném výkonu. /Pozn.: pokud nechcete být informována o plánovaném výkonu, nemusíte číst následující text. Podepište prosím pouze níže uvedené prohlášení a odevzdejte informační list svému ošetřujícímu lékaři./

### **VLASTNÍ OPERAČNÍ VÝKON:**

Laparoskopie může být:

1. Diagnostická – pouze k přehlédnutí malé pánve a dutiny břišní
2. Operační – s výkonem na vejcovodech, vaječnicích nebo děloze

V celkové anestezii se naplní dutina břišní kyslíčným uhličitým, následně je zaveden přes břišní stěnu laparoskop (optické zařízení umožňující přehlédnout malou pánev a dutinu břišní). Pokud je plánován laparoskopický operační výkon je nutné provést další drobné kožní řezy, kterými jsou zaváděny operační nástroje do dutiny břišní, tkáň uvolněná laparoskopicky jsou vytaženy přes stěnu břišní. Laparoskopicky uvolněná děloha je odstraněna pochvou.

Pro nečekanou obtížnost operace nebo nepředvídatelné komplikace může být někdy laparoskopicky započatá operace dokončena klasicky řezem přes břišní stěnu

### **DŮSLEDKY OPERACE:**

Po odstranění nebo přerušení obou vejcovodů nemůže již žena otěhotnět. Odstranění jednoho vaječníku neovlivní další život ženy. Po odstranění obou vaječníků dojde k potížím spojeným s nedostatkem ženských pohlavních orgánů (návaly, osteoporóza a arterioskleróza) a je proto následně vhodná náhrada ženských hormonů pomocí tablet nebo náplastí. Odstranění dělohy znamená ukončení plodnosti a měsíční krvácení, ale neovlivňuje průběh intimního života.

V porovnání s operacemi řezem přes břišní stěnu je pooperační průběh po laparoskopických výkonech pacientky lépe snášen a doba rekonvalescence je kratší.

### **MOŽNÉ KOMPLIKACE:**

Žádná operace není bez rizika komplikací. Nejvýznamnějším jsou „trombóza“, tj. vytvoření se krevních sraženin např.: v žilách dolních končetin k uzavření žilního řečiště. Další komplikací bývá krvácení během operace, nebo infekce operační rány či močových cest v období pooperačním. Vyjíměčně, zejména při komplikovaném výkonu (obezita, srůsty, anatomické úchylny) může dojít k neúmyslnému poranění okolních orgánů např. střeva, močového měchýře či močovodu. Tato poranění mohou vést k rozšíření původního operačního výkonu nebo k opakované operaci. Vzácnou komplikací jsou „píštěle“ tj. samovolně vzniklá spojení např. mezi močovým měchýřem a pochvou, která pak k úpravě stavu vyžaduje další operační výkon.

Velmi vzácnou komplikací může být poranění velké tepny, které může vést až ke smrtelnému krvácení.

Prim. MUDr. Ján Šándor  
primář gyn.por.oddělení

Naše stručná informace není vyčerpávající, Na všechno, co Vás ve vztahu k plánované operaci dále zajímá, nebo co považujete za důležité, se prosím zeptejte lékaře, který za Vámi v den před operací odpoledne přijde. Ujišťujeme Vás, že celý tým našeho oddělení pracuje tak, aby se Vaše operace zdařila bez komplikací.

Jméno pacientky:.....

Rodné č:.....

Pohovor provedl lékař:.....

Razítko a podpis lékaře:

Prohlašuji, že jsem obdržela potřebné informace o operačním výkonu a těmito informacím jsem plně porozuměla. Byla jsem osobně poučena a lékaři, který mi poskytl potřebné informace, jsem měla možnost klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno. Informacím jsem plně porozuměla a výslovně souhlasím s navrhovaným výkonem. Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.

V Rychnově nad Kněžnou dne:..... Podpis pacientky:.....