



## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM

### Laparotomie (otevření dutiny břišní) s výkonem dle nálezů

Vážená paní,

bylo Vám doporučeno provedení operační revize dutiny břišní. Chceme Vám poskytnout informace, které by prohloubily Vaše informace a vědomosti o plánovaném výkonu.

Po provedení všech dostupných vyšetření výsledky ukazují na možné onemocnění orgánů uložených v malé pánvi - dělohy, vaječníků, vejcovodů, močového měchýře, střeva. Výkon je nutný k přesnému určení rozsahu a charakteru onemocnění. Operace může ukázat, že Vaše potíže vycházejí z jiných orgánů dutiny břišní.

#### Postup:

- otevření dutiny břišní z kožního řezu od pupku ke sponě kosti stydké nebo příčně v podbřišku
- revize dutiny břišní vizuálně či palpačně
- částečné či úplné odstranění nemocných orgánů k mikroskopickému vyšetření
- sešití řezu břišní stěny

Během operačního výkonu můžeme zjistit, že k úspěšnému léčení Vašich obtíží je nutné odstranit dělohu nebo oba vaječníky s vejcovody - náhrada jejich hormonální funkce je možná běžně dostupnými léky. Definitivní rozsah operace na nemocných orgánech se může stanovit až během operace, kdy odebrané vzorky se mikroskopicky vyšetří. Během operace se může zjistit, že se jedná

o zhoubné onemocnění. Potom bude výkon patřičně rozšířen nebo i ukončen.

#### Možné komplikace:

Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Díky pokroku v medicíně jsou komplikace velmi zřídka. Mezi všeobecné komplikace operačních výkonů patří trombóza (krevní sraženiny v žilách např. dolních končetin), embolie (uzavření žil krevní sraženinou např. v plicích), ileus (neprůchodnost střev), infekce močových cest. Může dojít ke silnějšímu krvácení během operace, po operaci, nebo infekci v operačním poli. I přes pečlivé a šetrné operování může dojít k poranění močového měchýře, močovodu, střeva. Další možnou komplikací je komunikace mezi např. pochvou a močovým měchýřem. Jejich odstranění vyžaduje nový operační výkon. Tato poškození mohou vést k rozšíření stávajícího operačního výkonu.

#### Doporučení:

Oboustranné odstranění vaječníků, vejcovodu nebo dělohy vede k neplodnosti, po odstranění obou vaječníků či dělohy se již neobjeví pravidelné menstruační krvácení. Mohou se objevit výpadové obtíže stejné jako u žen v přechodu. Jejich hormonální funkce se dá nahradit běžně dostupnými léky (kromě případu kdy hormonální léčbu nelze podat ze zdravotních důvodů).



**Nemocnice  
Náchod**

Oblastní nemocnice Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou  
Gynekologicko-porodnické oddělení  
Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou, tel. č. 494 502 111

Pobyt v nemocnici trvá asi týden. Další léčba a péče je závislá na výsledku konečného mikroskopického vyšetření odebraných částí orgánů. Při propuštění budete poučena o následné pooperační rehabilitaci a následných kontrolách.

Prim. MUDr. Ján Šándor  
primář gyn. por. oddělení

Jméno pacientky:.....

Rodné č:.....

Pohovor provedl lékař:.....

Razítko a podpis lékaře:

Prohlašuji, že jsem obdržela potřebné informace o operačním výkonu a těmito informacím jsem plně porozuměla. Byla jsem osobně poučena a lékaři, který mi poskytl potřebné informace, jsem měla možnost klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno. Informacím jsem plně porozuměla a výslovně souhlasím s navrhovaným výkonem. Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.

V Rychnově nad Kněžnou dne:.....

Podpis pacientky:.....