

Příprava pacienta k enteroskopickému vyšetření

4 dny před vyšetřením

- vynechte tyto léky: preparáty obsahující železo (Ferronat, Sorbifer, FerroFolgamma apod./ léky, které snižují motilitu trávicího traktu (spasmolytika, analgetika).

1 den před vyšetřením

- odpoledne již nejezte, dopoledne je možno podávat pouze tekutiny (lehká polévka v poledne či bujon, čaj, káva, minerálky, ovocné šťávy);
- v případě známek pomalého vyprazdňování trávicí trubice či opakované gastrokopie z důvodu nevyprázdněného žaludku je možno podávat dopoledne pouze tekutiny (lehká polévka v poledne či bujon, čaj, káva, minerálky, ovocné šťávy);
- s přípravou začněte v **17 hodin**, kdy před vyšetřením vypijete 1 litr přípravku **Picoprep**. Vypijte první sáček naředěný ve 150ml studené vody. Poté je nutné dostatečně pít – alespoň 2 litry tekutin během 4 hodin.

V den vyšetření

- druhý sáček **Picoprep** nařeďte a požijte stejným způsobem v **7 hodin**, vypijte opět 2 litry tekutin (dle Vaší chuti a tolerance);
- pít můžete pouze čiré tekutiny;
- 4 hod před vyšetřením již nepijte;
- součástí vyšetření je i podání léků s tlumivým účinkem. V těchto případech nelze po vyšetření 24 hodin řídit motorová vozidla ani vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost.

Doporučujeme zajistit si k vyšetření doprovod.

- V případě provádění **balonové enteroskopie** jsou nemocní do druhého dne hospitalizováni z důvodů sledování možného podráždění slinivky břišní. V tomto případě se výkon provádí v analgosedaci či celkové anestezii.

- Před příchodem na naše pracoviště se laskavě zaregistrujte v Infocentru v přízemí Ambulantního pavilonu A Oblastní nemocnice Náchod.
- Vyšetření se provádí na Endoskopickém centru Oblastní nemocnice Náchod, Ambulantní pavilon A, 4. patro, kde vyčkejte v čekárně.

- Datum vyšetření: