

Prohlášení lékaře

Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným způsobem informoval o veškerých shora uvedených skutečnostech, plánovaném vyšetření, léčebném postupu a to včetně upozornění na možné komplikace. Pacient byl též seznámen s plánovaným způsobem anestézie (sedace), bude-li použita.

64	OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
001	NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Interní odd. - přím. MUDr. Richard Vondruška
104	Gastroenterologická ambulance Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou tel. 494 502 306, 111 IČO: 26000232

_____ datum

_____ jméno a příjmení lékaře

_____ podpis lékaře

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) SE SEDACÍ

Pacient/ka (jméno, příjmení): _____

R.č.: _____

Zákonný zástupce (jméno, příjmení): _____

V případě, že není stanoven, proškrtnout

1. Informace o výkonu

Sedace je technika cíleného ovlivnění vědomí pomocí léků. Je využívána při diagnostických i terapeutických výkonech, které jsou bez jejího použití nepříjemné, bolestivé či stresující. Sedace je říditelný stav útlumu vědomí a variantně i vnímání bolesti. Cílem sedace je navodit zklidnění, potlačit emoční odezvu na vnímané podněty, snížení pravděpodobnosti zapamatování nepříjemných prožitků, případně potlačení bolestí.

Vlastní technika spočívá v podání léků, či jejich kombinace a sledování pacienta za účelem dosažení potřebné hloubky sedace.

Léky jsou podávány nitrožilně, proto je nutné punktovat žílu a zavést nitrožilní kanylu. Obvykle je při výkonu podáván kyslík.

Ke sledování slouží obvykle senzor pulsního oxymetru na prst či ucho, manžeta k měření krevního tlaku, případně elektrody ke sledování EKG.

2. Očekávaný přínos (prospěch) výkonu

Díky sedaci lze provést i výkony, které by jinak byly neúnosně nepříjemné, bolestivé či stresující. Současně sedace znamená malou lékovou zátěž a přijatelně rychlé zotavení s malým rizikem nežádoucích účinků.

3. Rizika výkonu

Obecně je sedace dobře snášeným výkonem ovšem s některými zdravotními riziky. Rizika sedace jsou odvozena od nežádoucích účinků použitých léků (benzodiazepiny, opiáty, další sedativa). Pro nejčastější využívané preparáty tj. benzodiazepiny a opiáty jsou k dispozici léky schopné zvrátit jejich účinek. Většina nežádoucích účinků je sice nepříjemná, avšak zdravotně nezávažná, vážné komplikace ohrožující zdraví či život jsou vzácné.

I. Obecná rizika sedace

- Imunitní poruchy: alergické reakce různého stupně.
- Poruchy nervového systému: prodloužená sedace, spavost až kóma, amnézie i na

události po skončení výkonu, bolesti hlavy, závratě, třes, bezděčné pohyby, zhoršení nervosvalové koordinace, snížení svalového tonu nebo naopak svalová ztuhlost, svědění bez kožních projevů.

- Poruchy psychiatrické: zmatenost a dezorientace, euforie, agitovanost, záchvaty vzteku, hyperaktivita, útočné chování.
- Poruchy respirační: útlum až zástava dýchání, laryngospasmus.
- Poruchy srdeční: poklesy tlaku, poruchy rytmu, srdeční zástava.
- Poruchy gastrointestinální: nevolnost, zvracení sucho v ústech.

II. Individuální rizika sedace

Specificky zvýšené riziko nežádoucích účinků lze očekávat v následujících situacích:

- Při známé alergii na použité léky.
- Při současném užívání léků ovlivňujících nervový systém.
- Při chronickém onemocnění dýchacího systému - především chronické obstrukční chorobě bronchopulmonální.
- Při závažném srdečním onemocnění - především v situacích, kdy je významně snížen srdeční výdej.
- Při onemocněních s poruchou svalového napětí a síly.
- U lidí starších šedesáti let.
- U malých dětí.

Riziko u těchto specifických skupin lze snížit vhodným dávkováním a výběrem léků, proto musí lékař podávající sedaci obdržet informace o veškerých přidružených onemocněních, užívaných lécích a alergiích.

Většina výše uvedených nežádoucích účinků je léčena bezprostředně nebo odeznívá spontánně, některé mohou vést k prodloužení hospitalizace. Zástava oběhu a těžká alergická reakce s šokem jsou závažné stavy přímo ohrožující život a vyžadují resuscitační péči.

4. Alternativy výkonu

Alternativy k sedaci jsou provedení výkonu s komplexní anesteziologickou péčí či za plného vědomí. Výkon prováděný za plného vědomí znamená snížení lékové zátěže pacienta, provádí se pouze lokální znecitlivění. Nevýhodou je, že pro řadu pacientů je pak výkon neúnosný pro dráždivost či bolest.

5. Možná omezení v důsledku výkonu, léčebný režim, preventivní opatření, kontrolní výkony

Po výkonu je pacient po zhodnocení jeho celkového stavu lékařem propouštěn do domácí péče nebo je dále hospitalizován.

O další hospitalizaci je rozhodnuto podle celkového stavu pacienta a podle charakteru výkonu. Samotná nekomplikovaná sedace není důvodem k hospitalizaci. Pacient má mít po propuštění z nemocnice doprovod dospělou osobou.

Po dobu 24 hodin po výkonu není možné vykonávat činnosti náročné na úsudek, pozornost a

nervosvalovou koordinaci, především jde o řízení vozidel, ovládání strojů, pohyb ve výškách, právní úkony a obecně přijímání závažných rozhodnutí. Dále je zvýšené riziko pádu se zraněním.

6. Otázky

Absolvoval jste v minulosti vyšetření/výkon v sedaci/celkové anestézii?

ANO NE

Vyskytly se během tohoto zákroku komplikace (např. reakce na podané léky)?

ANO NE

Užíváte někdy prášky na spaní?

ANO NE

Máte alergii?

ANO NE

7. Odpovědi na doplňující otázky pacienta (případně uvést, že pacient žádné doplňující otázky neměl)

Souhlas pacienta/zákonného zástupce

Já níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl (a) lékařem srozumitelně informován (a) o veškerých shora uvedených skutečnostech, plánovaném vyšetření, léčebném postupu včetně upozornění na možné komplikace. Údaje a poučení mi byly lékařem sděleny a vysvětleny, porozuměl (a) jsem jim a měl (a) jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením vyšetření, léčebného postupu (viz výše), případně s použitím popsané sedace včetně provedení dalších výkonů, pokud by jejich neprovedení bezprostředně ohrozilo můj zdravotní stav.

_____ datum

_____ podpis pacienta (zákonného zástupce)

_____ podpis svědka

Důvod, pro který nemohl pacient souhlas podepsat: