



INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM

Umělé přerušení těhotenství ve II. trimestru

Vážená paní,
na základě žádosti nebo ze zdravotních důvodů Vám bude provedeno umělé přerušení těhotenství. Chceme Vám poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu. Účelem výkonu je umělé vyvolání děložních stahů a potrat plodu poševní cestou jako při porodu.

Průběh:

Na začátku může být příprava děložního hrdla zavedením Dilapanových tyčinek, které časem nabobtnají a bezbolestně hrdlo rozšíří. Obdobně můžeme postupovat i zavedením vaginálních tablet Prostinu E2 v přípravě hrdla a k vyvolání děložních stahů.

Nebo pod ultrazvukovou kontrolou, po dezinfekci se přes břišní stěnu do amniální dutiny zavádí tenká jehla a aplikuje se látka, která má vyvolat děložní stahy. Doba tohoto výkonu je v minutách. Dále budete sledována na gynekologickém oddělení nemocnice.

Nástup děložních stahů je individuální, zpravidla do několika hodin. Budou-li stahy příliš bolestivé, můžete dostávat léky tlumící bolest, nebo epidurální anestezii. Při slabých děložních stazích je zesílíme léky v infúzi. Časový interval potratu se nedá odhadnout, trvá od několika hodin až do 48 hod. Po potratu je nutno vybavit zbytky plodového vejce z dutiny děložní. Tento výkon se provádí na operačním sále v celkové anestezii otevřeným děložním hrdlem, kyretou. Části plodového vejce jsou odeslány k mikroskopickému vyšetření.

Možné komplikace:

Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Díky pokroku v medicíně jsou komplikace velmi zřídka. Aplikaci léku do plodového vejce či vaginálně může provázet nevolnost či zvracení. Potrat plodu může být provázen silnějším krvácením, které nás někdy přinutí vybavit plod břišní cestou jako u císařského řezu. Teplotou se mohou projevit infekční komplikace.

Doporučení:

Po výkonu doporučujeme postup podobný jako v šestinedělí po porodu. Doba pobytu v nemocnici je několik dní. Při propuštění budete informována o následných kontrolách a pooperační rehabilitaci.

První menses se dostaví po výkonu za 4-6 týdnů. Další těhotenství doporučujeme až po ukončení všech nutných vyšetření, plánovaně za 3-6 měsíců. Je vhodné se proto zabezpečit antikoncepcí.

Prim. MUDr. Ján Šándor
primář gyn. por. oddělení



**Nemocnice
Náchod**

Oblastní nemocnice Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Gynekologicko-porodnické oddělení
Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou, tel. č. 494 502 111

Jméno pacientky:.....

Rodné č:.....

Pohovor provedl lékař:.....

Razítko a podpis lékaře:

Prohlašuji, že jsem obdržela potřebné informace o operačním výkonu a těmto informacím jsem plně porozuměla. Byla jsem osobně poučena a lékaři, který mi poskytl potřebné informace, jsem měla možnost klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno. Informacím jsem plně porozuměla a výslovně souhlasím s navrhovaným výkonem. Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.

V Rychnově nad Kněžnou dne:.....

Podpis pacientky:.....