

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S VÝKONEM ZÁVĚSNÁ OPERACE MOČOVÉ TRUBICE POŠEVNÍ CESTOU POMOCI PÁSKY (TOT,TVT)

Vážená paní,

na základě provedených vyšetření Vám byla doporučena závěsná operace. Chceme Vám poskytnout informace, které by prohloubily Vaše informace a vědomosti o plánovaném výkonu. Výsledky vyšetření ukazují na poruchu uložení močové trubice a močového měchýře. Podstatou výkonu je obnovení schopnosti udržet moč.

PRŮBĚH:

Výkon se provádí v celkové anestezii.

- protěti přední poševní stěny pod ústím močové trubice
- protažení pásky do dvou kožních řezů nad stydkou sponou nebo v tříselech a její volné
- uložení pod močovou trubici
- upevnění a odstřížení konců pásky
- zašití poševních i kožních řezů
- zavedení cévky do močového měchýře na jeden den

MOŽNÉ KOMPLIKACE:

Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace.

Díky pokroku v medicíně jsou komplikace velmi zřídka. Mezi všeobecné komplikace operačních výkonů patří trombóza (krevní sraženiny v žilách např. dolních končetin), embolie (uzavření žil krevní sraženinou např. v plicích), infekce močových cest. Může dojít k silnějšímu krvácení během operace, po operaci, nebo infekci v operačním poli, močové infekci. I přes pečlivé a šetrné operování může dojít k poranění močového měchýře, močové trubice, což může na přechodnou dobu způsobit krvavé zbarvení moče. Další možná komplikace je krvácení do prostoru mezi kostí stydkou a močovým měchýřem. Další možnou komplikací jsou komunikace mezi např. pochvou a močovým měchýřem. Jejich odstranění vyžaduje nový operační výkon. Tato poškození mohou vést k rozšíření stávajícího operačního výkonu.

DOPORUČENÍ:

Závěsná operace močové trubice a močového měchýře může vést po dobu několika dnů až týdnů k potížím s močením jako např. časté močení, obtížné či nedokonalé vyprázdnění močového měchýře. Pobyť v nemocnici při nekomplikovaném průběhu je jen několik dní. Nejméně 6-8 týdnů se vyvarujte těžší práce, pohlavního styku, jízdy na kole, zácpě. Snažte se hned od začátku tlumit případný kašel po domluvě se svým praktickým lékařem. Pijte hodně tekutin. Celkové zhojení a výsledek výkonu se projeví do 2-3 měsíců. Při propuštění budete poučena o následné pooperační rehabilitaci a následných kontrolách.

Prim. MUDr. Ján Šándor
primář gyn.por.oddělení

Jméno pacientky:.....

Rodné č:.....

Pohovor provedl lékař:.....

Razítko a podpis lékaře:

Prohlašuji, že jsem obdržela potřebné informace o operačním výkonu a těmto informacím jsem plně porozuměla. Byla jsem osobně poučena a lékaři, který mi poskytl potřebné informace, jsem měla možnost klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno. Informacím jsem plně porozuměla a výslovně souhlasím s navrhovaným výkonem. Prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně života nebo zdraví.

V Rychnově nad Kněžnou dne:..... Podpis pacientky:.....